

Flogmýs í Føroyum:

Fremmandur gestur ger innrás



Dorete Bloch
doreteb@savn.fo



Jens-Kjeld Jensen
jkjensen@olivant.fo

Flogmýs í Føroyum, ja, tað ljóðar sum ein skemtisøga! Men ein grein úr altjóða tíðarritinum Acta Chiropterologic hevur savnað allar flogmýs, sum eru sæddar í Norðsjónum. Umrøddar eru flogmýs, ið til og við 2012 vórðu sæddar í Føroyum, Íslandi, Orknoyggjum, Hetlandi og á boripallum í Norðsjónum. Hetta er gjørt í samstarvi millum granskarar í Íslandi, Skotlandi og Føroyum.

12 ymisk sløg eru greinað. Fýra sløg eru komin úr Amerika til Íslands, meðan hini átta sløginu eru evropeisk. Av teimum 12 sløgnum eru fimm ymisk funnin í Føroyum, í Hetlandi og Orknoyggjum, seks á boripallum og átta í Íslandi.

Ein av gátunum hevur verið, hvussu flogmúsini kom til Føroyar og onnur oyggjalond í Norðrhøvum. Hendinga ferð vita vit, at flogmús er lend á skipi og á henda hátt komin um hav. Men tær flestu hava ivaleyst flogið sjálvar. Tær flogmýs, ið hava langar, smalar veingir, eru oftast flytiflogmýs, ið ferðast millum eitt reiðrarstað og eitt vetrarbøli, eins og galdandi er fyri flytifugl. Vit tosa millum annað um Leislerflogmús og Trøllflogmús.

Tær stöðufastari flogmýsnar hava rundari veingir. Her er til dømis talan um Norðflogmús og Niðuflogmús.

Øll sløginu eru vilst henda vegin. Líkindi eru ikki hjá flogmús at liva í Føroyum – ikki enn í øllum førum. Við okkara kalda og óstøðuga veðurlagi er ikki grundarlag fyri, at flogmýs kunnu útvega sær nóg mikið av føði um summarið, og veturin er ov heitur til, at tær kunnu fara í dvala.

Flogmýs nærur gerandiskostur

Tann fyrsta frábøðanin um flogmús í Føroyum kom frá Eyðuni Winther umleið 1964 á Trøðum á Sandi. Men talið av sæddum flogmúsum er vaksið tey seinastu tríati árinu. Niels á Botni og pápi hansara, Petur á Botni, eygleiddu báðir djóralívið í Nólsoy



Trøllflogmús



Hýggiflogmús

HEIMILDIR:

Dietz, C., Helversen, C.O. von and Nill, D. 2009.

Bats of Britain, Europe and northwest Africa. A. and C. Black Publishers Ltd. London. 400 pp.

Petersen, A, Jensen, J-K., Jenkins, P., Bloch, D. and Ingimarsson, F. 2014. A review of the occurrence of bats (Chiroptera) on islands in the North East Atlantic and on North Sea installations. *Acta Chiropterologica* 16,1: 169-195.

seinastu 150 árinum, og fyrsta flogmúsinn varð sæddur í 1987. Eftir það eru 25 sæddar í Nólsoynni í tíðarskeiðinum 2000-2009.

Vanliga sæst bara ein flogmús hvørja ferð, men í einum av hesum fòrinum eru upp til 12 sæddar samstundis. Í 2010 høvdu vit eina innrás av flogmúsum í Føroyum, tá minst 45 vórðu sæddar. Áleið 70 ymiskar fráboðanir um flogmús komu hetta árið. Flestu flogmús hava verið sæddar um heystið, færri um várið.

Tey fimm sløgini, ið eru funnin í Føroyum

Norðflogmús (*Eptesicus nilsonii*) er sæddur eina ferð. Kroppurin er 48-54 mm og vigar 8-13 gramm. Norðflogmúsinn er tann vanligsta flogmúsinn í Norðurlondum og er funnin heilt norður til pólkeringin.

Niðuflogmús (*Eptesicus serotinus*) er somuleiðis bara sæddur eina ferð. Niðuflogmúsinn er eitt sindur størri enn Norðflogmúsinn. Kroppurin er 62-80 mm langur og vigar 17-35 gramm. Flogmúsinn var funnin í eini timburgoymslu. Niðuflogmúsinn livir annars í øllum Evropa norður til 55°.

Leislerflogmús (*Nyctalus leisleri*) er eisini bara sæddur eina ferð her. Hetta er ein stór flogmús við einum kroppi millum 54-64 mm og eini vekt, sum er 14-20 gramm. Flogmúsinn er ikki vanlig og finst mest í Onglandi og Írlandi og norður til Skotlands, har hon er sjáldsom. Hetta slagði flýgur eisini um dagin.

Trøllflogmús (*Pipistrellus nathusii*), sí mynd, er funnin 17 ferðir í Føroyum. Flogmúsinn er long, 44-48 mm, kløn og vigar bara 6-9 gramm. Útbreiðslan er mest í landssynningspartinum av Evropa, men slagði hevur breitt seg norður eftir, og eigur í dag bæði í Danmark og Onglandi.

Hýggiflogmús, sí mynd (*Vespertilio murinus*), er funnin tvær ferðir her. Kroppurin er 55-63 mm langur og vigar 12-14 gramm. Hýggiflogmúsinn er tann næstvanligsta í Norðurlondum aftan á Trøllflogmúsina. Finst eins og Trøllflogmúsinn mest í landssynningspartinum av Evropa, men tó eisini í syðra parti av Norra og Svøríki.

Vit vilja sera fegin hoyra um flogmús. Vit hava nú eitt tól, ið tekur upp flogmúsáljóð, og vit eru tí før fyrri at greina slagði á ljóðinum. Áhugað kunnu útvega sær greinina frá *Acta Chiropterologica* við at venda sær til ein av rithøvundunum.

Faktaboks:

Flogmús hava verið til í 70 mill. ár. Í dag finnast meira enn 1.100 sløg, og 51 av teimum eru funnin í Evropa og Norðurafrika.

Flogmús eitur Chiroptera í djórafrøðini, og er það einasta súgdjórið, ið ikki hevur lús!

Sløgini í Útnorðri liva øll av skordjórum, men aðrastaðni eta tey sera ymiska føði sum frukt, skriðdjór, smærri súgdjór og eisini fisk. Tann kendasta er vampyr flogmúsinn, ið drekkir blóð.

Flestu flogmúsnar flúgva í myrkri, og sjálf um tær hava eygu, stýra tær við høgum ljóðbylgjum, sum menniskju í flestum fòrum ikki hoyra. Við ljóðbylgjum kunnu tær stýra uttan um alt, ið forðar teimum á leiðini, og hvørt flogmúsaslag hevur sína egnu ljóðmynd. Tí er það møguligt hjá okkum at kenna sløgini aftur á ljóðmyndini.