

Lille Stormsvaler søger føde under havoverfladen

JENS-KJELD JENSEN

Den 10. april 1992 var Eiríkur og Eivindur Jacobsen på arbejde ombord på langlineskibet *Jógvan Norða* ca 20 sømil vest for Mykines, Færøerne, på ca 62°00'N, 8°20'W. Mellem kl. 00:00 og 02:00, hvor der var helt vindstille, så de i projektorlyset adskillige Små Stormsvaler *Hydrobates pelagicus* søge føde under havoverfladen.

Langlinen trækkes op mens skibet sejler med ca 1 knob. Der hvor langlinen kommer op af vandet, er en cirkel på ca 3 m i diameter oplyst af projektorer. Agn, som sidder tilbage på krogene, smuldrer og løsner sig, og man kan også formode, at linen trækker smådyr med op fra havbunden. Her er det at de Små Stormsvaler kommer ind i billedet (også helt bogstaveligt!). I en dybde af op til 20 cm kom de svømmende ind i lyskeglen langs langlinen, i små kvikke etaper af ca 1 m, stak lige hovedet op for at trække vejret, og dykkede igen. Når de kom ud af lyskeglen, forsvandt de i mørket, men der var til stadighed 2-3 stk. i syne under vandet i de to timer, observatorerne havde vagt. Stormsvalerne svømmede ved hjælp af vingerne, omtrent som Storskråper *Puffinus gravis*, som observatorerne ofte har set svømme neddykket ved Grønland. Samtidig mindede stormsvalernes undervandsjagt meget om svalernes insektjagt i luften.

Den beskrevne adfærd afviger stærkt fra alt hvad der i øvrigt er skrevet om Lille Stormsvaler fødesøgning. Warham (*The Petrels*, Academic Press, 1990) skriver om stormsvalerne i almindelighed, at "Diving and surface-seizing of food seem to be unusual," og Cramp & Simmons (*The birds of the western Palearctic*, Vol. I, Oxford University Press, 1977) om Lille Stormsvaler, at den "Feeds during the day from surface ... without alighting." Intet om natfouragering, og intet om svømning un-

der overfladen. Det behøver imidlertid ikke at betyde, at det er en sjælden foreteelse. Med mindre havoverfladen som i det beskrevne tilfælde er spejlblank – og det er den næsten aldrig – vil det være svært at se fuglene. Desuden er ornitologer sjældne gæster på langlinefartøjer, og kun de færreste fiskere vil, hvis de bemærker fuglene, have lejlighed til bagefter at fortælle det til nogen, der kan bringe det videre.

Summary: Sub-surface night-foraging of Storm Petrels *Hydrobates pelagicus*

Fishermen aboard the long-line vessel *Jógvan Norða* witnessed an apparently so far undescribed behaviour of the Storm Petrel during the night (00-02 hrs) of 10 April 1992, when the line was hauled in at a station 20 nautical miles west of Mykines (c. 62°00'N, 8°20'W). The Storm Petrels came swimming into the spotlight along the long-line up to 20 cm below the perfectly calm surface of the sea; occasionally they surfaced momentarily to breathe but otherwise continued until disappearing out of the lighted area. At any time during the two hours, two-three birds were in view. They seemed to seek disintegrating bait from the line and perhaps also small invertebrates brought to the surface by the line. When swimming underwater they used their wings approximately like Great Shearwaters *Puffinus gravis*, a species familiar to the fishermen when fishing in Greenland waters.

Jens-Kjeld Jensen,
FR-270 Nólsoy,
Færøerne