


MULIGT OVERVINTRINGSOMRÅDE FOR SYDPOLARKJOVE, *STERCORARIUS MACCORMICKI*, VED FLEMMINGS KAP

Sydpolarkjoven fra Flemmings Kap. *MacCormick Skua from Flemmings Kap.*

Lige før julen 1978 fik jeg anledning til at undersøge to kjoever, som var hjembragt fra fiskeri ved Flemmings Kap, position $47^{\circ}\text{N}, 45^{\circ}\text{V}$ som er 300 sømil uden for Newfoundland. Fuglene afveg fra Storkjover *Stercorarius skua* ved at være ensfarvet mørkebrune, undtagen hovedet, som også var ensfarvet men betydeligt lysere end resten af fuglen. Herved kunne de identificeres som Sydpolarkjover *S. maccormicki*.

Kjoeverne havde bidt på fiskekroge, og blev bragt hjem til Nólsoy og foræret til en fugleinteresseret, som havde fået dem udstoppet. Fiskeren fortalte, at de var fanget først i august måned 1978, og at der var mange »Storkjover« at se. Han havde ikke lagt mærke til om de indfangede var mere ensfarvede end de øvrige, og det var på ingen måde udvalgte fugle, han havde haft med hjem. Så man fristes til at tro, at der har været flere af arten *S. maccormicki*.

Den ene af fuglene har jeg lånt og set nærmere på. Vingerne er næsten ensfarvede mørkebrune, uden Storkjovens karakteristiske lyse streg, halen ensfarvet brunsort, bug, bryst og forhals ensfarvet gråbrun. Hoved og baghals er lidt lysere, men fjerene er meget slidte. Kropssider og bryst er i kraftig fældning. halen er helt nyfældet bortset fra den næst yderste fjer i begge sider, der kun er halvt udvokset. Skulder-

fjerene er alle nyudvoksede. De fleste vingedækfjer er udskiftede. De fire yderste håndsvingfjer er alle fældet, men nye er på vej ud og har følgende mål, regnet udefra: 2,5 cm, 6 cm, 10 cm og 20 cm. Fuglen må have været dårligt flyvende! Jeg tog følgende mål: Næb, fra fjerkant, 51 mm, hale 148 mm, tarsus 68 mm, mellemtå med negl 62 mm, ydertå 58 mm, indertå 43 mm. Den anden Sydpolarkjove lignede umiddelbart den her beskrevne.

At Sydpolarkjoven trækker til det nordatlantiske område blev først påvist af Salomonsen (Dansk orn. Foren. Tidsskr. 70: 81-89, 1976), men der foreligger hidtil ingen oplysninger om koncentrerede overvintningsområder.

ENGLISH SUMMARY: Possible wintering quarters for MacCormick's Skua *Stercorarius maccormicki* on the New Foundland Banks.

Two skuas, caught in August 1978 randomly from a larger number of observed birds, near Flemmings Kap ($47^{\circ}\text{N}, 45^{\circ}\text{V}$) were later identified as the Antarctic species *Stercorarius maccormicki*.

Jens-Kjeld Jensen,
3815 Nólsoy